

Корь – это наиболее заразное из инфекционных заболеваний. Если не болевший корью или не привитый человек общается с больным, то вероятность заражения приближается к 100%. Возбудитель болезни – вирус. Корь принято относить к «детским» инфекциям, однако, люди, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоко восприимчивыми к ней в течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте. Как правило, у взрослых это заболевание протекает намного тяжелее, чем у детей. При заражении беременной женщины корью на ранних сроках беременности, в 20% случаев происходит самопроизвольный аборт или возникают пороки развития плода. Наиболее частые осложнения со стороны плода – олигофрения (слабоумие) и поражения нервной системы - хуже всего диагностируются на этом этапе развития беременности. Поэтому перед наступлением желанной беременности даже привитым от кори женщинам следует сдать анализы на антитела к кори и при необходимости сделать прививку (ее можно делать только за несколько месяцев до беременности, а не во время беременности).

Источник инфекции – больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле, разговоре. Порой даже мимолетная встреча восприимчивого к этой инфекции человека с больным корью приводит к заболеванию. Больной человек особенно опасен в конце инкубационного периода и до 4-го дня после появления сыпи.

Инкубационный период длится 9-11 дней. Сначала повышается температура до 38-39°C и более, снижается аппетит, нарушается сон; появляются насморк, чихание, покраснение конъюнктив, слезотечение и светобоязнь, сухой грубый «лающий» кашель. Затем на фоне усиления всех симптомов болезни начинает поэтапно распространяться сыпь. Первые элементы сыпи отмечаются за ушами, на лице, потом на шее и верхней части груди, на туловище, руках ногах.

Корь опасна своими осложнениями, среди которых ларингит, трахеобронхит, воспаление лёгких, воспаление среднего уха, круп, энцефалит и миокардит.

Единственной эффективной мерой профилактики кори является плановая вакцинация.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок вакцинация против кори проводится:

- -детям в возрасте 12 месяцев, ревакцинация в 6-летнем возрасте;
- -подросткам и взрослым до 35 лет, не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о профилактических прививках против кори;

- -контактным лицам из очагов заболевания, не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о профилактических прививках против кори – без ограничения по возрасту.